Campaña productiva
2022/23

AAPPCE

INFORME

Situación en **Cultivos extensivos** en las principales zonas productivas

Monitoreo de **Insectos, enfermedades y malezas**

Datos correspondientes
del 20/10 al 14/11/2022

RedMIP

06

Auspician

BASF
We create chemistry

Fastac® Duo
Insecticida

SUMMIT AGRO

HOWLER
ISDV TECHNOLOGY

CORTEVA™
agriscience

Intrepid® SC
INSECTICIDA

BAYER

Roundup TOP®

Distribución territorial



Nodos AAPPCE

#ElMonitoreoEnTodosLados

Hacé click en la zona que querés ver →

1 NOA
Luciano Devani y Lucas Cazado

2 Este de Sgo. del Estero y Norte de Santa Fe
SMC Monitoreo (Martín Galli y Rodrigo G. Russo) y Agrotesteo (Pablo Nazar y Francisco Cosci).

3 Santa Fe Centro
Fabián Gamba, VMW Siembras (C. Grosso, B. Milanesio y L. Vettorelo) y Agroestudio Rafaela (F. Caraffini y H. Villada)

4 Córdoba Centro Norte
Gonzalo De loredo y Ariel De loredo.

5 Córdoba Este
Cume SRL (Ramiro Oviedo Bustosy Nicolás Montero Bulacio), José Namur, Juan Pautassi, Santiago Mortigliengo y José Cruz Cuello.

6 Entre Ríos
CBAgro (Pablo Angelotti y Analía Curti), Luciano Azario y Consagro (Carina Gallegos y otros)

7 Centro Sur de Santa Fe
Cume srl (Ramiro Oviedo Bustos y Nicolás Montero Bulacio), CBAgro (Pablo Angelotti y Analía Curti), Consultora Cárcamo Ag (Juan. I. Cárcamo), Nicolás Falcinelli, Mariano Calderone, M. Torresi, Sebastián Olivieri, Leonel Tornotti, Vanesa Taborra y Ariel Ricci.

8 Sur de Santa Fe
Agroconsultor (Juan Dall'Orso y Guillermina Brusasca), Aggro (Guillermo Garro y José A. Batista), Maximiliano Spinollo, Daiana Durán, Servicio Agrícola Integral (Santiago Lucero) y Mauricio Durany.

9 Norte de Bs. As.
Martín Principiano, Lares SRL, Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Alejandro Ladaga, Sebastián Arias, Dos Agro (Daniela Ibarra y Ludmila Cuvells), LMAgro (Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky), Acertagro (Agustín Acerbo y Cristian Tanoni) y Nueva Agronomía (M. Pastore).

10 Oeste de Buenos Aires
ProyectAgro (R. Robledo y L. Demichelis), ODS (M. Mortarini y L. Martínez), Asesoragro (P. Baloriani y J. Deagustini), Consultora Oeste (M. Luzzi y P. Telechea), Agroconsultora Pampa (D. Pundang), Surcos Consultora (C. Asenjo y S. Mari) y Cecilia Durisotti.

11 Suroeste de Buenos Aires
La Medidora SRL (Mariano Moro y Adrián Fernández) y Guillemo Arro.

12 Sureste de Buenos Aires
Pablo Errazu, Aiagro (Luciano Piloni y Adrián Etcheto) y Viento sur (Esteban Bilbao y Julián Portugal).

Referencias

Niveles de riesgo adversidades

B

Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales poco predisponentes.

M

Pueden ocurrir ataques puntuales.

A

Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.

Condición climática general de la zona

BUENA

Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones.

REGULAR

Los cultivos enfrentan la demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico).

MALA

Exceso hídrico o estrés hídrico.



01 Nodo NOA

LOCALIDADES DE REFERENCIA

La Cocha, Burruyacú (Tucumán) - Metan, Las Lajitas (Salta)

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Regular

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Amaranthus *palmeri/hybridus*	SJ MZ	M
Chloris spp.	SJ MZ	B
Echinochloa colonum	SJ MZ	M
Eleusine indica	SJ MZ	M
Hirschfeldia incana	SJ MZ	M
Raphanus sativus	SJ MZ	M
Sorghum halepense	SJ MZ	A
Borreria spp.	SJ MZ	A

¿A qué prestar atención especialmente?

En los lugares donde tuvimos lluvias estar atentos al nacimiento de malezas problemas de verano.

Observaciones generales


Las condiciones hídricas para afrontar la siembra de granos gruesos son muy limitantes en un 70% de la región.

FECHA
14/11
2022

REPORTAN
Luciano Devani y Lucas Cazado

REDACTOR REPORTE
Luciano Devani

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



02 Nodo Este de Santiago del Estero y Norte de Santa Fe

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Santiago del Estero
Moreno y Bandera
Santa Fe
Ceres y San Guillermo

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Mala

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** cosechando

GR **Girasol:** R5

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Rachiplusia nu	GR	B
Spodoptera frugiperda	MZ	B
Tetranychus urticae	GR	M

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Amaranthus *palmeri/hybridus*	BCHO	M
Chloris spp.	BCHO	A
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	BCHO	M
Echinochloa colonum	BCHO	M
Eleusine indica	BCHO	M
Digitaria sanguinalis	BCHO	M
Pappophorum sp.	BCHO	M
Sonchus oleraceus	BCHO	M
Sorghum halepense	BCHO	M

¿A qué prestar atención especialmente?

A malezas luego de las precipitaciones (pocas).

Observaciones generales


La condición hídrica de sequía - con un panorama de precipitaciones muy espaciadas y de bajo milimetraje- y las bajas temperaturas, hacen que los cultivos, como trigo, estén muy deteriorados; y en el caso de girasol, muy lento.

FECHA
11/11
2022

REPORTAN
SMC Monitoreo (Martín Galli y Rodrigo G. Russo) y Agrotesteo (Pablo Nazar y Francisco Cosci).

REDACTOR REPORTE
Martín Galli

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



03 Nodo Santa Fe Centro

RedMIP ALERTA NACIONAL

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Vila, Rafaela, San Jerónimo Norte, San Agustín, San Vicente, San Jorge y Piamonte

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** Z73 a madurez fisiológica.

SJ **Soja:** Avance muy lento de siembra. Algunos lotes en V1.

GR **Girasol:** V6-R2.

MZ **Maíz 1°:** V3-V7.

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo	
Complejo de gusanos de suelos	MZ B
Helicoverpa gelotopoeon	SJ M
Faronta albilinea	TR B
Rachiplusia nu	GR B

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo	
Amaranthus *palmeri/hybridus*	GR MZ SJ A
Chloris spp.	GR MZ SJ M
Cyperus rotundus	GR MZ SJ M
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	GR MZ SJ M
Echinochloa colonum	GR MZ SJ A
Eleusine indica	GR MZ SJ M
Eragrostis sp.	GR MZ SJ B
Digitaria sanguinalis	GR MZ SJ A
Lamium amplexicaule	GR MZ SJ M
Parietaria debilis	GR MZ SJ A
Sonchus oleraceus	SJ B
Sorghum halepense	GR MZ SJ A

¿A qué prestar atención especialmente?

En relación a los girasoles y maíces, evaluar situación de malezas previo al cierre de surcos. Monitorear bolillera en soja puesto que en las primeras sojas emergidas ya se observa la plaga.

Observaciones generales


Los trigos están pronto a iniciar la cosecha, se espera rendimientos bajos para la zona debido a las condiciones de sequía durante la campaña y efecto de heladas tardías. En relación al girasol y maíz, su desarrollo está condicionado por la situación climática, hay lotes puntuales muy afectados por las heladas tardías (09-10 y 01-11). Los barbechos largos a soja vienen realizándose en general. El avance de siembra de soja es menor que lo normal para la época.

FECHA
11/11
2022

REPORTAN
Fabián Gamba, VMV Siembras (Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo) y Agroestudio Rafaela (Franco Caraffini y Hernán Villada).

REDACTOR REPORTE
Fabián Gamba.

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



04 Nodo Córdoba Centro Norte

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Villa María del Río Seco, Villa María y Corralito

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

SJ **Soja:** muy poca superficie sembrada

MZ **Maíz:** sin sembrar

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Complejo de cortadoras	MZ SJ (BCHO)	B
Dichelops furcatus	MZ (BCHO)	B
Complejo de gusanos de suelos	MZ (BCHO)	B

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Brassica rapa	MZ (BCHO)	M
Carduus acanthoides	SJ MZ (BCHO)	B
Chloris spp.	SJ MZ (BCHO)	A
Commelina erecta	SJ MZ (BCHO)	M
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	SJ MZ (BCHO)	M
Eleusine indica	SJ MZ (BCHO)	B
Gamochaeta spicata	SJ MZ (BCHO)	M
Parietaria debilis	SJ MZ (BCHO)	M
Senecio vulgaris	SJ MZ (BCHO)	M
Sonchus oleraceus	SJ (BCHO)	M
Sorghum halepense	SJ MZ (BCHO)	A
Borreria Verticillata	SJ MZ (BCHO)	M
Triticum aestivum	SJ (BCHO)	M
Urochloa platyphylla	SJ MZ (BCHO)	M

¿A qué prestar atención especialmente?

Se esperan lluvias generalizadas. Seguir los pulsos de emergencia de malezas para definir la incorporación de preemergentes.

Observaciones generales


Las precipitaciones ocurridas el 26 de octubre fueron suficientes para desencadenar el nacimiento de algunas malezas, sin embargo siguen predominando la presencia de perennes como borrería, alepo y comelina.

FECHA
11/11
2022

REPORTAN
Gonzalo De Loredo y Ariel De Loredo.

REDACTOR REPORTE
Gonzalo De Loredo.

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



05 Nodo Córdoba Este

RedMIP ALERTA NACIONAL

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Marcos Juárez, Monteo Buey, Ordoñez y Río Cuarto

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

GR **Girasol:** V6

MZ **Maíz:** V4-V6

SJ **Soja:** Vc

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo

Conyza *bonariensis y sumatrensis*	GR M
Gomphrena perennis	BCHO A SJ B
Gomphrena pulchella	BCHO A SJ B
Sorghum halepense	BCHO A SJ B

¿A qué prestar atención especialmente?

-

Observaciones generales


Maíces: recuperándose de las heladas, organizando refertilizaciones a la espera de las lluvias. Girasoles: en estados generales muy buenos. Sojas: recién emergiendo y algunos lotes con ligeras demoras.

FECHA
11/11
2022

REPORTAN
Cume SRL (Ramiro Oviedo Bustosy Nicolás Montero Bulacio), José Cuello, José Namur, Juan Pautassi y Santiago Mortigliengo.

REDACTOR REPORTE
José Cuello

AUSPICIAN



06 Nodo Entre Ríos

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Santa Anita, Herrera, Villa Elisa, Nogoyá (Don Cristóbal, Algarrobitos, Sauc). Diamante (Palmar, Costa Grande, Isletas). Tala (Raíces). Victoria (Chilcas)

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Buena / Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** EF: Z 8.0 a 9.0

AV **Avenas:** Cobertura: quemadas químicamente. Grano (sembradas en junio): llenado de grano.

VIC **Vicia:** EF: Fructificación

MZ **Maíz:** EF: V5 a V9

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Drechslera tritici repentis	TR	B
Puccinia striiformis	TR	B

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

MALEZAS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Commelina erecta	MZ	B

¿A qué prestar atención especialmente?

-

Observaciones generales


Trigo: lotes que comenzaron a cosecharse con 3000 a 4500 kg/ha. Avena Negra: cosechas con rendimientos entre 2000 a 2500 kg/ha. Maíz: crecimiento y desarrollo heterogéneo. Efecto de heladas leves con mínimas pérdida de plantas y notables retrasos de crecimiento en zonas deprimidas de los lotes. Repaso de herbicidas en tratamientos postemergentes. Fertilización nitrogenada incorporada a partir de las precipitaciones. Soja: avances en la superficie de siembra con aplicaciones pre-emergentes ejecutadas.

FECHA
14/11
2022

REPORTAN
CBAgro (Pablo Angelotti y Alberto Zanczuk), Luciano Azario y Consagro (Carina Gallegos y otros).

REDACTOR REPORTE
Pablo Angelotti.

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



07 Nodo Centro Sur de Santa Fe

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Zavalla, Casilda, Carcarañá, Bustinza y Gálvez

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Mala

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

- **TR** **Trigo:** cosecha
- **LJ** **Lenteja:** cosecha
- **MZ** **Maíz:** V3-V4
- **SJ** **Soja:** Ve-Vc
- **GR** **Girasol:** V8

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo

Armadillidium vulgare	BCHO	B

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo

Amaranthus *palmeri/hybridus*	BCHO	M
Chenopodium allbum	BCHO	B
Chloris virgata	BCHO	B
Commelina erecta	BCHO	B
Echinochloa colonum	BCHO	M
Eleusine indica	BCHO	B
Eragrostis sp.	BCHO	B
Gnaphallium	BCHO	B
Parietaria debilis	BCHO	B
Sorghum halepense	MZ BCHO	M
Urochloa platyphylla	BCHO	M
Urochloa planicoides	BCHO	M

¿A qué prestar atención especialmente?

Comienza la emergencia de malezas estivales, yuyo colorado y gramíneas. Profundizar el monitoreo cuando se presenten precipitaciones.

Observaciones generales

Inició la trilla de trigo con rendimientos muy variables, desde 10 a 35 qq/ha.

Girasol y maíz: presentan desuniformidad por frío y recuperándose del daño de heladas.


Soja: poca superficie sembrada, entre 10 y 15%.

FECHA
11/11
2022

REPORTAN
Cume srl (Ramiro Oviedo Bustosy Nicolás Montero Bulacio), CBAgro (Pablo Angelotti y Alberto Zanczuk), Consultora Cárcamo Ag (Juan. I. Cárcamo), Nicolás Falcinelli, Mariano Calderone, M. Torresi, Sebastián Olivieri, Leonel Tornotti, Vanesa Taborra y Ariel Ricci.

REDACTOR REPORTE
Nicolás Montero Bulacio.

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



08 Nodo Sur de Santa Fe

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Venado Tuerto, Teodelina, María Teresa, Diego de Alvear

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Mala

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** Z 7.1 / Z 8.0

MZ **Maíz:** VE/V4

SJ **Soja:** Ve

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

Cultivo y Nivel de riesgo

No se reportaron datos

INSECTOS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Complejo de cortadoras	MZ	B
Faronta albilinea	TR	B
Schizaphis graminum	TR	B
Tetranychus urticae	SJ	B

MALEZAS

Cultivo y Nivel de riesgo		
Amaranthus *palmeri/hybridus*	MZ SJ	B
Commelina erecta	MZ SJ	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	MZ SJ	M
Eleusine indica	MZ SJ	B
Digitaria sanguinalis	MZ SJ	B
Lollium sp. Rye grass	MZ SJ	B

¿A qué prestar atención especialmente?

Detección de arañuela (Tetranychus urticae) en lote puntual, pero de continuar las condiciones de atmósfera seca ayudaría a su dispersión.

Observaciones generales

En trigo se dieron de baja gran cantidad de lotes debido a sequías y heladas, en algunas zonas cerca del 90% de la superficie sembrada fue quemada. En aquellos lotes que se decidió continuar se esperan rindes entre 10 y 20 qq/ha.


La siembra de soja y maíz está avanzando lentamente y esperando las lluvias pronosticadas para los próximos días.

FECHA
11/11
2022

REPORTAN
Agroconsultor (Juan Dall'Orso y Guillermina Brusasca), Aggro (Guillermo Garro y José A. Batista), Maximiliano Spinollo, Daiana Durán, Santiago Lucero y Mauricio Durany.

REDACTOR REPORTE
Guillermina Brusasca

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



09 Nodo Norte de Buenos Aires

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Pergamino, Junín, Ramallo y Chacabuco.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Mala

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** Z 7.0-9.0

CB **Cebada:** Z 7.0-9.0

ARV **Arveja:** vaina llena

SJ **Soja:** Ve-Vc

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Drechslera teres	CB	B
Puccinia striiformis	TR	B
Puccinia triticina	TR	B

INSECTOS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Acyrtosiphon pisum	ARV TR	B
Agrostis *malefida / ipsilon*	SJ MZ	B
Agrotis ipsilon	SJ MZ	B
Complejo de gusanos de suelos	SJ MZ	M
Helicoverpa gelotopoeon	SJ MZ	M
Faronta albilinea	TR	M
Schizaphis graminum	TR	B
Thysanoptera	ARV	B

MALEZAS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Amaranthus *palmeri/hybridus*	SJ MZ	M
Brassica rapa	SJ MZ	M
Carduus acanthoides	SJ MZ	B
Chloris spp.	SJ MZ	B
Cyperus rotundus	SJ MZ	B
Commelina erecta	SJ MZ	M
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	SJ MZ	A
Echinochloa colonum	SJ MZ	M
Eleusine indica	SJ MZ	B
Digitaria sanguinalis	SJ MZ	B
Gamochaeta spicata	SJ MZ	B
Hirschfeldia incana	SJ MZ	B
Lollium sp. Rye grass	SJ MZ	M
Sorghum halepense	SJ MZ	M
Conyza spp	SJ MZ	M

¿A qué prestar atención especialmente?

Se sugiere monitorear las malezas estivales luego de las lluvias y evaluar los controles de los barbechos cortos y pre emergentes. También estar atentos a la aparición de complejo de cortadoras y de isocas bolilleras.

Observaciones generales

La situación hídrica es muy complicada, se está dificultando el control de malezas por el estrés hídrico que presentan. En algunas localidades las últimas lluvias permitieron la realización de barbechos cortos y se están aplicando los preemergentes aprovechando las precipitaciones de los próximos días. Cultivos invernales: los lotes con arvejas están perdidos, sólo algunos -muy puntuales- se van a cosechar. Los daños por helada en trigo fueron muy severos. Esto se va a ver reflejado en los rindes, en gran parte de las localidades del Nodo se están secando o haciendo rollos. En los lotes de trigo que están en mejor estado se aplicó para Faronta albilinea (oruga desgranadora). Soja de primera: muy poco avance de la siembra, sólo en lotes con justa humedad y esperando las lluvias del fin de semana del 13 de Noviembre para arrancar con el grueso de la siembra. Maíz: no hay siembras tempranas, se pasa todo a tardío. Sorgo: lotes puntuales con humedad ya se sembraron.

Informe #6 | Campaña 2022 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.

Datos correspondientes del 20/10 al 14/11/2022

FECHA

11/11

2022

REPORTAN


Lares SRL (Martín Principiano), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Alejandro Ladaga, Sebastián Arias, Dosagro (Daniela Ibarra y Ludmila Cuvells), LMAgro (Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky), Acertagro (Agustín Acerbo y Cristian Tanoni) y Nueva Agronomía (Matías Pastore) DyP Agro (Lucio Corbanini)

REDACTOR REPORTE

Daniela Ibarra

AUSPICIAN

CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



10 Nodo Oeste de Buenos Aires

LOCALIDADES DE REFERENCIA

América, Pehuajó, Robert, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa y Daireaux

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Buena / Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** Z55 -Z70

CB **Cebada:** Z65 -Z80

MZ **Maíz temprano:** V2-V4

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Drechslera teres	CB	B
Puccinia striiformis	TR	M
Puccinia triticina	TR	M

INSECTOS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Schizaphis graminum	TR	M
Tetranychus major	TR	M

MALEZAS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Chenopodium album	SJ GR MZ	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	SJ GR MZ	A
Raphanus sativus	SJ GR MZ	B
Lollium sp. Rye grass	SJ GR MZ	M
Amaranthus	SJ GR MZ	B

¿A qué prestar atención especialmente?

En los cultivos de trigo y cebada hacer seguimiento a pulgón, arañuela, y royas (amarilla, anaranjada y del tallo) en los casos de trigos más atrasados.

Observaciones generales

Maíces tempranos: atravesando estadios vegetativos entre V2-V4, en la mayorías de los casos con la fertilización de urea realizada. Las heladas tardías afectaron varios lotes que ahora se están recuperando.


Hay grandes avances en la siembra de soja, alcanzando el 80% en promedio de la zona Oeste.

FECHA
12/11
2022

REPORTAN
ProyectAgro (Rita Robledo y Lucía Demichelis), ODS Agro (Mauro Mortarini y Leonardo Martínez), Asesoragro (Pablo Baloriani y Joaquin Deagustini), Consultora Oeste (Martín Luzzi y Pedro Telechea), Agroconsultora Pampa (Diego Pundang), Surcos Consultora (Carlos Asenjo y Silvina Mari) y Cecilia Durisotti.

REDACTOR REPORTE
Rita Robledo.

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



11 Nodo Suroeste de Buenos Aires

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Carhué (*) y Coronel Dorrego
Bahía Blanca (**)

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** Z7.05 (*) y Z7 (**)
CB **Cebada:** Z7.1 (*) Z7 (**)
MZ **Maíz temprano:** siembra a V6 (*) Siembra a V10(**)
GR **Girasol:** siembra a V2 (*) Siembra a V6 (**)
Soja: siembra

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Drechslera teres	CB	M
Puccinia striiformis	TR	A
Rhizoctonia	CB	B
Septoria tritici	TR	B

INSECTOS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Agrostis *malefida / ipsilon*	MZ GR	A
Armadillidum vulgare	BCHO GR	A
Complejo de gusanos de suelos	TR CB MZ	B
Faronta albilinea	TR CB	M
Listronotus sp	TR	B
Schizaphis graminum	TR CB	B

MALEZAS

	Cultivo y Nivel de riesgo	
Amaranthus *palmeri/hybridus*	BCHO	A
Ammi majus	BCHO MZ	B
Avena Fatua	TR CB BCHO	M
Brassica rapa	TR CB BCHO	B
Bowlesia	TR CB	B
Centaurea solstitialis	TR CB	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	TR BCHO	M
Euphorbia hirta	BCHO MZ	A
Digitaria sanguinalis	BCHO MZ	B
Hirschfeldia incana	TR CB BCHO	M
Lamium amplexicaule	TR CB MZ	B
Polygonum aviculare	TR CB	M
Lollium sp. Rye grass	TR CB	B
Salsola Kali	BCHO MZ	A
Senecio vulgaris	TR CB BCHO	B
Sonchus oleraceus	TR CB	B
Sorghum halepense	BCHO MZ	B
Stellaria media	TR CB	B

¿A qué prestar atención especialmente?

A los deficientes controles de pre emergentes producto de la falta de lluvias. También a la aparición de algunas malezas en pre cosecha.

Observaciones generales


Las condiciones hídricas siguen siendo deficientes. Si bien los cultivos presentan, en general, buen desarrollo y cobertura, los perfiles ya están secos. No se han observado daños importantes de heladas. Se han producido pérdidas por granizo en algunos lotes daños que van del 10 al 60%.

FECHA
14/11
2022

REPORTAN
La Medidora SRL (Mariano Moro y Adrián Fernández) y Guillemo Arro.

REDACTOR REPORTE
Adrián Fernández

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO



12 Nodo Sureste de Buenos Aires

LOCALIDADES DE REFERENCIA

Necochea, Dorrego, Tres Arroyos.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL

Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

- **CB** **Cebada:** Z 75-Z 85
- **TR** **Trigo:** Z 70-Z 75
- **GR** **Girasol:** siembra
- **MZ** **Maíz:** siembra

RedMIP ALERTA NACIONAL

ENFERMEDADES

	Cultivo y Nivel de riesgo
Drechslera teres	CB A
Drechslera tritici repentis	TR M
Puccinia striiformis	TR A
Rhynchosporium secalis	CB A

INSECTOS

	Cultivo y Nivel de riesgo
Faronta albilinea	TR CB M
Schizaphis graminum	TR CB M
Diuraphis noxia	TR CB B
Milax gagate	GR B
Armadillidium vulgare	GR SJ M

MALEZAS

	Cultivo y Nivel de riesgo
Ammi majus	Cult. inv. BCHO B
Brassica rapa	Cult. inv. BCHO A
Carduus acanthoides	Cult. gruesa B
Cebadilla	Cult. inv. BCHO B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	Cult. inv. BCHO M
Euphorbia dentata	Cult. gruesa B
Hirschfeldia incana	Cult. inv. BCHO M
Raphanus sativus	Cult. inv. BCHO M
Lollium sp. Rye grass	Cult. inv. BCHO M
Stellaria media	BCHO a gruesa B
Viola tricolor	Cult. inv. BCHO B

¿A qué prestar atención especialmente?

Se sugiere monitorear orugas desgranadoras en cebada y trigo. También los insectos en lotes a girasol/soja/maíz.

Observaciones generales

Pulgón ruso en cereales de invierno. Nacimientos de Brassica rapa. Primeros nacimientos de Amaranthus. Muchos lotes de cebada y trigo con grandes daños de helada.

FECHA
14/11
2022

REPORTAN
Pablo Errazu, Aiagro (Luciano Piloni y Adrián Etcheto) y Viento sur (Esteban Bilbao y Julián Portugal).

REDACTOR REPORTE
Pablo Errazu.

AUSPICIAN
CORTEVA agriscience · BAYER · BASF We create chemistry · SUMMIT AGRO

agro:slide:bank

Agro Portal Profesional


El sitio web de información actualizada que visitan profesionales, técnicos, docentes, alumnos, productores y empresas relacionadas con el agro.

Contamos con imágenes específicas del agro en alta definición y diseños que integran folletos, manuales, videos, material publicitario y didáctico de las más variadas aplicaciones, comerciales y pedagógicas.

Realizamos seguimiento de ensayos y desarrollo visual para todos los cultivos, plagas y enfermedades.

a:s:b www.asb.com.ar








Auspician

BASF
We create chemistry

Fastac® Duo
Insecticida

SUMMIT AGRO

HOWLER
ISDV TECHNOLOGY

CORTEVA™
agriscience

Intrepid® SC
INSECTICIDA

BAYER

Roundup TOP®

RedMIP

Alerta Nacional

#ElMonitoreoEnTodosLados

informesredmip@aappce.org

#InformeRedMIP - @aappce

www.aappce.org.ar/informes

10 AÑOS

AAPPCE